

ジプレキサ®を服用される患者さんとご家族の方へ

このお薬の服用中に、体重の増加や、血糖値(血液中のブドウ糖の量)の上昇がみられることがあります。

そのため、**糖尿病の方、糖尿病といわれたことのある方**は、このお薬は服用していただけません。お心当たりのある方は、必ず、服用される前に主治医の先生もしくは薬剤師の先生に、ご相談ください。また、**ご親族に糖尿病の方がいる方、血糖値が高いといわれたことがある方、肥満傾向の方、体重が増加してきた方**は、糖尿病になりやすい方ですので、服用される前に必ず主治医の先生もしくは薬剤師の先生に、ご相談ください。服用されている間は、**特に血糖値と体重の変化には気を付けてください。**

主治医または薬剤師への連絡先

ジプレキサ®を服用される患者さんとご家族の方へ

ジプレキサ®を安全に服用していただくために、裏面の注意事項を必ずお読みください。

ジプレキサ錠 2.5mg



ジプレキサ錠 5mg



ジプレキサ錠 10mg



ジプレキサ細粒 1%



ジプレキサザイデイス錠 2.5mg



ジプレキサザイデイス錠 5mg



ジプレキサザイデイス錠 10mg



※このお薬には錠剤と粉薬がありますが、有効成分は同じです。

このような症状があらわれた場合には、
必ずすぐに主治医の先生に連絡し、診察を受けてください。

監修：
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所 付属
永寿総合病院
糖尿病臨床研究センター センター長
渥美 義仁 先生

糖を含む飲料水(ジュース、炭酸飲料、スポーツドリンクなど)を急にたくさん飲むと、血糖値が急激に上昇する可能性があります。
激しいのどの渇きがある場合は、**ジュースなど糖分を含む飲料水を飲むのをやめて、**すぐに主治医の先生に連絡し、診察を受けてください。



急に体重が
減ってきた

激しい
のどの渇き



何回もトイレに
行きたくなる



おしっこが
多くなる

これらの症状があらわれてそのまま放置しておくと、倒れてしまうことがあります。

上記の症状は血糖値が高くなった時に、あらわれる場合があります。

この他にも、気になることがありましたら、主治医の先生や薬剤師の先生にご相談ください。